



Ahora nos vamos a meter en temas más profundos... Despeja tu mente.... Líbrate de prejuicios... No desesperes; opón tesón ante la perplejidad... Y si, a pesar de todo, no entiendes nada... no te aflijas pues, a fin de cuentas, todo esto no es más que teoría que muy probablemente nunca llevarás a la práctica... ya que, para eso, es necesario poseer un barco en condiciones para una navegación oceánica...

Empieza pues con la...

NAVEGACIÓN ASTRONÓMICA

NAVEGACIÓN ASTRONÓMICA:

De las coordenadas geográficas

De las coordenadas azimutales

De las coordenadas horarias

De la variación de las coordenadas horarias de un astro a lo largo de un día

De la Eclíptica

Del Zodiaco

De las coordenadas Uranográficas Ecuatoriales

De las coordenadas horarias del sol

De las coordenadas horarias de las estrellas

1ª PARTE

Del triángulo de posición astronómica

De las fórmulas

2ª PARTE

La derrota ortodrómica

Funciones trigonométricas fundamentales

RECTA DE ALTURA

Del Polo de iluminación y del círculo de alturas iguales

De la recta de altura

Del modo de situarse con una recta de altura a partir de una situación de estima

3ª PARTE

Del modo de situarse con dos rectas de altura simultáneas

Del modo de situarse con dos rectas de altura **no** simultáneas

De la altura meridiana

De las estrellas

De cómo se hace una recta de altura

4ª PARTE

Más de cómo situarse con dos rectas de altura

De cómo calcular la altura estimada de un astro

4ª PARTE

De las utilidades de una sola recta de altura

De las fórmulas

Del cálculo de la latitud con una recta de altura meridiana

5ª PARTE

Del cálculo de la latitud por una observación de la $\star P$

Método para calcular la longitud a partir del $h\star I$ y del $h\star G$

De la medida del tiempo

6ª PARTE

Cálculo del intervalo navegado hasta el momento de una efeméride astronómica

Cálculo del intervalo hasta el momento del paso del sol por el meridiano superior estando el buque en movimiento

DE LAS CORRECCIONES

De las correcciones a las horas del orto y ocaso

Cálculo de la corrección total por una observación de la $\star P$

Cálculo de la corrección total por la observación del azimut del sol
en el momento del orto u ocaso

7ª PARTE

Cálculo de la corrección total con la fórmula del azimut verdadero

Cálculo de la corrección de la altura instrumental de un astro

Paso de la altura del sol limbo superior a la altura del sol limbo inferior

Siguiente

Buena pregunta... Chup, Chup...
Vamos a ver... Chup... Chup...
Eso más que una pregunta es un examen...

Vamos a hacer un pequeño recordatorio previo de las coordenadas Geográficas, Azimutales y horarias. ¿Qué quieres ver primero?


Coordenadas Geográficas

Coordenadas Azimutales

Coordenadas Horarias

Capitán: me pasan una pregunta:
Diferencias entre el cálculo de la situación exacta a partir de una situación de estima y la observación puntos conocidos en la costa y el cálculo de la situación exacta a partir de una situación de estima y la observación de los astros.





COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUD Y LONGITUD

Sitúan un punto en relación a dos ejes de coordenadas que son:

ECUADOR: círculo máximo perpendicular al eje de giro

Sobre él se mide la **LONGITUD** y, a partir de él la **LATITUD**

MERIDIANO "CERO" O DE GREENWICH:

círculo máximo, paralelo al eje de giro, a partir del cual se cuentan los demás meridianos. Geográficamente es el que pasa por Greenwich y, más ampliamente, por Aragón.

A partir de él se mide la **LONGITUD**. La **Latitud** se puede medir sobre cualquier meridiano pues todos ellos son círculos máximos

LONGITUD: sector de círculo máximo que, a partir del meridiano 0°, llega al meridiano de situación del punto.

LATITUD: sector de círculo máximo que pasa por los polos y un punto a partir del ecuador.

...De tal manera que un punto sobre el Globo terráqueo se sitúa con dos coordenadas:

Grados, minutos y segundos de latitud (Norte ó Sur)

Y Grados, minutos y segundos de Longitud (Este u Oeste).

COORDENADAS ACIMUTALES


Las coordenadas horizontales o acimutales de un astro son la **ALTURA VERDADERA** y el **AZIMUT**.

Nuestra situación determina un **Zenit (Z)**, un **Nadir (Z')** y un **horizonte visible** que es perpendicular al cenit.

Z y el polo forman un ángulo a no ser que el observador esté en el polo

Si situamos un astro y trazamos un círculo máximo que pase por Z-★-Z', la proyección del astro sobre el horizonte nos dará la **ALTURA** sobre el mismo (medida en grados).

La **ALTURA** es el arco vertical del astro comprendido entre el horizonte y el centro del astro, o almicantarat. Se cuenta de 0° a 90° a partir del horizonte. Cuando el astro está encima del horizonte, la altura es positiva; cuando está por debajo la altura es negativa y no interesa al marino porque no la podrá observar. En este caso se dice que "el astro está depreso".




AZIMUT (Z) : es el arco de horizonte comprendido entre el vertical del observador (Polo-Z-Polo) y el vertical del astro (Z-★-Z') medido desde el Norte. Hay tres clases de azimutes:

Azimet náutico: Se cuenta desde el norte de 0° a 360° por el Este y se llama circular, se designa por tres cifras y siempre es positivo. Es "el Rumbo que habría que poner para ir hacia la proyección del astro sobre el horizonte" expresado en circular

Azimet por cuadrantes: El azimet náutico recibe el nombre de cuadrantal cuando se cuenta desde uno de los puntos cardinales N ó S más próximo hasta el pie del vertical del astro. Se mide de 0° a 90° hacia el Este o al Oeste (en el ejemplo: S45W) Es "el Rumbo que habría que poner para ir hacia la proyección del astro sobre el horizonte" expresado en Cuadrantal

Azimet astronómico o ángulo cenital: es el arco de horizonte contado desde el polo elevado (del mismo nombre que la latitud) hasta el vertical del astro. Si se cuenta hacia el E es oriental y hacia el W es occidental. Siempre es menor de 180°

- no confundir Z con el Cenit: cuando aparece "Z", siempre se refiere al Azimet -





DISTANCIA CENITAL (dz) es el complemento de la altura: la diferencia de la altura con el cenit (90 - altura).

Si un astro está en el horizonte está en el ocaso y su distancia al punto E - W es la AMPLITUD. La amplitud es el complemento del acimut cuadrantal. Se utiliza únicamente en los ortos y en los ocasos de los astros, llamándose amplitud ortiva en los primeros y occidua en los segundos.

El ALMICANTARAT es el lugar geométrico de todos los puntos de la esfera celeste que tienen la misma altura. Se llama también círculo de alturas iguales, es un círculo menor paralelo al horizonte

El VERTICAL DEL ASTRO es el lugar geométrico de todos los puntos de la esfera que tienen el mismo azimut.

Para verlo claro; si ponemos rumbo al astro, todos los objetos que encontramos en nuestro camino tienen el mismo rumbo, es decir; la misma orientación respecto del norte geográfico, o sea: el mismo Azimut



Volver

Volver37

Índice

Clic

COORDENADAS HORARIAS


En estas coordenadas, el plano fundamental es el ecuador.


Las coordenadas son el **HORARIO**
Y LA DECLINACIÓN

HORARIO ASTRONÓMICO (h):

es el arco de ecuador comprendido entre el meridiano del observador y el meridiano del astro. Se cuenta de 0° a 360° , o de 0 a 24 horas a partir del **meridiano superior**, hacia el **oeste**. También se puede contar el horario de 0° a 180° (también llamado ángulo en el polo (p)), ó de 0 a 12 horas, por el este o por el oeste, llamándose **horario oriental** en el primer caso y **horario occidental** en el segundo. El horario occidental es siempre igual al astronómico ya que los dos se cuentan a partir del meridiano superior por el W, pero cuando el horario astronómico es mayor de 180° , se pasa a horario oriental restándolo de 360° .

Atención: no confundir "Hora" con "horario". Las horas comienzan a contarse a partir del meridiano opuesto al del observador, y los horarios comienzan a contarse en el meridiano del observador






La diferencia fundamental entre el cálculo de la situación exacta a partir de las demoras de dos o más accidentes geográficos conocidos, y el cálculo de la situación exacta a partir de la observación de los astros es que, **Independientemente del movimiento de rotación del mundo mundial**, los puntos de referencia que tomemos de la costa permanecen invariables con respecto a las coordenadas geográficas (latitud y Longitud), es decir; en este ejemplo los dos faros siempre tienen la misma situación en el globo terráqueo y el submarino, que está parado, tiene las mismas demoras de los faros, independientemente del movimiento de rotación planetario...

Pero en la navegación Astronómica los puntos de referencia son las estrellas y el sol... y más concretamente sus puntos astrales o “polos de iluminación, es decir; la proyección de esos astros sobre la superficie terrestre y, como se puede ver, mientras las estrellas están fijas en la bóveda celeste, la Tierra experimenta un movimiento de rotación sobre su eje...

...Y otro de traslación
alrededor del sol

Pues bien; para situarnos con el sol o las estrellas necesitamos situar las coordenadas horarias del sol o de las estrellas, es decir: su declinación y el horario que tengan respecto del meridiano del observador, en el momento justo de hacer la observación (al medir la altura del astro sobre el horizonte)...


...Ya que en las fórmulas que se emplean para el cálculo de una recta de altura intervienen la latitud de estima, la declinación y el horario del astro en el lugar





Con la rotación y la traslación, a lo largo del día la situación geográfica de la proyección sobre la Tierra de un astro (el denominado polo de iluminación o punto astral) varía. **De lo que se trata es de situar los puntos astrales con sus coordenadas horarias y una vez situados esos puntos es cuando se podrá situar el observador.**

En menor medida varía su declinación (la altura sobre el ecuador), pero su horario varía en 24 horas desde 180° E hasta 180° W, es decir; 360° . Recordemos que el horario es el equivalente a la coordenada de Longitud pero tomando como referencia el meridiano superior del lugar desde donde se hace la observación, en lugar del meridiano 0° . Este meridiano superior se mueve respecto del polo de iluminación; si el polo de iluminación está sobre el meridiano desde donde se hace la observación (meridiano superior), en las 12 horas siguientes el meridiano del observador se habrá alejado del polo de iluminación 180° por el ESTE (dejando al punto astral por el W) ... y en las siguientes 12 horas se acercará otros 180° por el W (estando el polo de iluminación al ESTE del meridiano del observador) y recordemos también que la declinación del astro es la latitud que tiene el polo de iluminación ...







Como hemos podido ver, aunque el plano de declinación no varía demasiado en un giro completo de la Tierra, el horario del astro (o lo que es lo mismo: del polo de iluminación) varía 360° en 24 horas.

Ejemplo: En un momento dado el barco tiene al astro en el meridiano superior, y supongamos que este sea el meridiano 0° , de Greenwich...

Al cabo de 6 horas, debido a la rotación de la Tierra, el meridiano de situación del barco se ha desplazado 90° respecto del polo de iluminación ...

Total que, así de repente, no parece que uno pueda situarse tomando como punto de referencia a los astros ya que estos no se están quietos, a diferencia de los puntos conocidos de la costa (salvo por la tectónica de las placas...) (repito por enésima vez que astros y puntos astrales y polos de iluminación es, a estos efectos, exactamente lo mismo)
Sin embargo....





...Yo de ti centraría mi atención en el ojo izquierdo...¡JA, JA, JA!!...

Bromas aparte, la pregunta es buena pero todo tiene su explicación, veamos:


Efectivamente es obvio lo que varía la coordenada de longitud debido al movimiento de rotación terrestre, y parece evidente también que el punto astral describe un círculo menor paralelo al ecuador por lo que, en apariencia, en todos los puntos de ese círculo menor la declinación del astro es la misma (Astro, polo de iluminación o punto astral, es lo mismo) ...

pero el asunto es que al movimiento de rotación de la tierra, hay que añadirle el de traslación... pues bien: este movimiento de traslación es el responsable de que la declinación del sol, en un día, varíe en unos pocos minutos. En el Almanaque Náutico las declinaciones del sol y los planetas vienen reflejadas para cada día en intervalos de 1 hora, y para las estrellas vienen reflejadas para cada mes.

Veo claro lo que varia la coordenada de Longitud entre el observador y el polo de iluminación de un astro **en función del tiempo**. Pero no veo como puede variar la declinación... aunque sea poco...



BOQUERÓN II



Sol

¡Chup...Chup...!



Clic

Índice



¿Cómo es posible que en el almanaque náutico vengan reflejados todos los horarios de las estrellas? Lo digo porque, redondeando al grado, es decir, sin tener en cuenta los minutos y segundos de longitud, el meridiano del observador puede estar en 360 lugares diferentes. Ejemplo: el observador está en una Longitud "X", entonces el almanaque debe de tener, para cada estrella, el horario que le corresponde para esa Longitud desde la que está siendo observado...

...Y eso no es todo, porque, además, ese horario es válido a una hora, minuto y segundo dado, pues al segundo siguiente el horario ha variado ya que nuestro meridiano ha cambiado de lugar respecto del polo de iluminación, alejándose o acercándose... total que en almanaque náutico tendría que haber miles de horarios para cada estrella... se puede calcular: redondeando al grado (sin tener en cuenta los minutos y segundos de Longitud del meridiano del observador) hacen falta 360 horarios distintos para cada estrella (180 hacia el E y 180 hacia el W), Y esos 360 horarios cambian a cada segundo... Para 12 horas harían falta : $12 \times 360 = 4320$ horarios distintos, si multiplicamos por 60 tendremos los horarios que harían falta minuto a minuto: $4320 \times 60 = 259200$... y si esa cifra la multiplicamos por 60, obtendremos los horarios para cada segundo del día, de un astro observado desde cualquier "grado" de Longitud... $259200 \times 60 = 15552000$ horarios distintos. Eso redondeando las Longitudes del observador al grado. Un grado tiene 60 minutos... si quisieramos los horarios para longitudes del observador teniendo en cuenta los minutos habría que multiplicar otra vez por 60...

...Mmmm...Y todo eso para una sola estrella... Pues en el almanaque vienen 99 estrellas !Qué pasada!
Ese almanaque debe ser más gordo que el libro de Petete.



BOQUERÓN II

Sin embargo el almanaque náutico resuelve el problema de los horarios para el sol, la luna y todas y cada una de las 99 estrellas que en él figuran, estando el observador en cualquier Longitud y a cualquier hora del día los 365 días del año...
...Y en pocas páginas!

Para el sol se basa en las **coordenadas horarias respecto del meridiano de Greenwich**, y para las **estrellas** se sirve de las **coordenadas Uranográficas Ecuatoriales**...

...Por vuestras caras veo que quizá sería conveniente repasar el tema de las coordenadas **URANOGRÁFICAS ECUATORIALES**... Ahora toca una pequeña y amena charla pues antes de entrar con las coordenada Uranográficas ecuatoriales hace falta tener claros dos conceptos: la eclíptica y el Zodiaco....

...Si, considero oportuna esa sugerencia...

Me adhiero a ese planteamiento

¡Uy! ¡Qué chicos tan cultos! Ja, Ja, Ja...!
¡No tenéis ni idea!



BOQUERÓN II

Clic

Índice

ECLIPTICA : Es la orbita aparente que describe el sol alrededor de la tierra de occidente a oriente en un año. Es una circunferencia de círculo máximo. El plano de la eclíptica forma con el ecuador un ángulo de 23º- 27' y los dos puntos ♈ (Aries) y ♎(Libra) en que la ecliptica corta al ecuador se llaman puntos equinocciales, porque al encontrarse el sol en ellos tiene declinación cero y el día es igual a la noche en cualquier lugar de la superficie terrestre. A Aries se le da el nombre de **primer punto de Aries, punto equinoccial de primavera, o punto vernal**. A Libra se le llama **primer punto de libra o punto equinoccial de otoño**.

Se llaman solsticios a los puntos que distan 90º de los equinoccios y en ellos el sol alcanza su valor máximo de declinación de 23º -27' empezando, a partir de ahí, a decrecer su valor hasta el siguiente punto equinoccial. En el hemisferio norte, al punto de mayor valor positivo (N) de la declinación del sol se le llama solsticio de verano y al de mayor valor negativo (S) solsticio de invierno.

El plano de la eclíptica divide a la esfera celeste en dos hemisferios que reciben el nombre de Norte el que contiene la estrella polar y sur el opuesto (que contiene a la estrella cruz del sur)

El círculo máximo que pasa por los polos del mundo y por los puntos equinocciales se llama **coluro de los equinoccios**. Y el que pasa por los polos y los puntos solsticiales recibe el nombre de **coluro de los solsticios**.

ZODIACO:

Es una zona esférica formada por círculos menores paralelos a la eclíptica separados a ambos lados de ella unos 9º. Todos los planetas, excepto Plutón, describen sus órbitas dentro de esta zona de unos 18º a la cual se le da el nombre de Zodíaco.


El zodíaco está dividido en 12 partes iguales, de 30º cada una, recibiendo dichas partes el nombre de signos de las constelaciones que hace 2000 años ocupaba su parte correspondiente(Hiparco, 150 a.c.).

En el sentido que el sol recorre la eclíptica en su movimiento aparente anual, tomando como origen el equinoccio de primavera, los signos zodiacales son; Aries(♈), Tauro(♉), Géminis(♊), Cáncer(♋), Leo(♌), Virgo(♍), Libra(♎), Escorpión(♏), Sagitario(♐), Capricornio(♑), Acuario(♒) y Piscis(♓).

El signo de Aries se extiende desde la Longitud celeste 0º hasta la de 30º, el de Tauro desde 30º a 60º, y así sucesivamente.

Por efecto de la precesión de los equinoccios durante los 2000 años transcurridos desde que se ideó el zodíaco, el primer punto de Aries se ha trasladado cerca de 30º, originando que actualmente el lugar de la constelación de Aries lo ocupe la de Piscis, y Libra ocupe la de Virgo.


Coordenadas
Aunque el ángulo de la eclíptica con el ecuador permanece constante, los puntos de intersección de Aries y Libra, debido a la precesión de los equinoccios se van moviendo y da lugar a que el punto vernal tenga un movimiento retrogrado (en el sentido de las agujas del reloj visto desde el polo N) de 50,2" de arco cada año.



...Para los esquemas de la eclíptica y el Zodiaco vamos a considerar a la tierra como un punto fijo en el cielo (Geocéntrica), y consideramos también la prolongación de los polos y del ecuador terrestres en la bóveda celeste...

ECLIPTICA : Es la órbita aparente que describe el sol alrededor de la tierra de occidente a oriente en un año. Es una circunferencia de círculo máximo. El plano de la eclíptica forma con el ecuador un ángulo de 23°- 27'


.. los dos puntos en que la eclíptica corta al ecuador en ♈ (Aries) y en ♎ (Libra), se llaman puntos equinociales porque cuando se encuentra el sol ellos su declinación cero, el sol se encuentra en el plano del ecuador y el día es igual a la noche en cualquier lugar de la superficie terrestre. A Aries se le da el nombre de primer punto de Aries, punto equinoccial de primavera, o punto vernal. A Libra se le llama primer punto de libra o punto equinoccial de otoño.



Se llaman **solsticios** a los puntos que distan 90° de los equinoccios y en ellos el sol alcanza su valor máximo de declinación de $23^\circ - 27'$ empezando, a partir de ahí, a decrecer su valor hasta el siguiente punto equinoccial. En el hemisferio norte, al punto de mayor valor positivo (N) de la declinación del sol se le llama solsticio de verano y al de mayor valor negativo (S) solsticio de invierno.

El plano de la eclíptica divide a la esfera celeste en dos hemisferios que reciben el nombre de Norte el que contiene la estrella polar y Sur el opuesto (que contiene a la estrella cruz del sur)

El círculo máximo que pasa por los polos del mundo y por los puntos equinociales se llama **coluro de los equinoccios**. Y el que pasa por los polos y los puntos solsticiales recibe el nombre de **coluro de los solsticios**



Zodiaco: Es una zona esférica formada por círculos menores paralelos a la eclíptica separados a ambos lados de ella unos 9°. Todos los planetas, excepto Plutón, describen sus órbitas dentro de esta zona de unos 18° a la cual se le da el nombre de Zodíaco.

El zodiaco está dividido en 12 partes iguales, de 30° cada una, recibiendo dichas partes el nombre de signos de las constelaciones que hace 2000 años ocupaba su parte correspondiente(Hiparco, 150 a.c.).


En el sentido que el sol recorre la eclíptica en su movimiento aparente anual, tomando como origen el equinoccio de primavera, los signos zodiacales son; Aries(♈), Tauro (♉), Géminis (♊), Cáncer(♋), Leo (♌), Virgo (♍), Libra (♎), Escorpión (♏), Sagitario (♐), Capricornio (♑), Acuario (♒) y Piscis (♓).

El signo de Aries se extiende desde la Longitud celeste 0° hasta la de 30°, el de Tauro desde 30° a 60°, y así sucesivamente

Por efecto de la precesión de los equinoccios durante los 2000 años transcurridos desde que se ideó el zodiaco, el primer punto de Aries se ha trasladado cerca de 30°, originando que actualmente el lugar de la constelación de Aries lo ocupe la de Piscis, y Libra ocupe la de Virgo.

Coordenadas

Aunque el ángulo de la eclíptica con el ecuador permanece constante, los puntos de intersección de Aries y Libra, debido a la precesión de los equinoccios se van moviendo y da lugar a que el punto vernal tenga un movimiento retrogrado (en el sentido de las agujas del reloj visto desde el polo N) de 50,2" de arco cada año.



COORDENADAS URANOGRÁFICAS


Sirven para situar una estrella en relación con el ecuador celeste y el primer punto de Aries. En este sistema de coordenadas interviene la eclíptica, ya que una de las coordenadas se cuenta a partir del primer punto de Aries. Las coordenadas uranográficas son:

DECLINACIÓN y la ASCENSIÓN RECTA.

El polo fundamental es el polo norte de la esfera celeste y el círculo fundamental es el ecuador celeste. Los semicírculos secundarios son los que unen los polos celestes y pasan por el centro del astro, y se llama MÁXIMO DE ASCENSIÓN al semicírculo que va del ecuador celeste al polo pasando por el astro (equivalente a una declinación en las coordenadas horarias). **El semicírculo que une los polos y que pasa por el primer punto de Aries se llama primer máximo de ascensión.** Los paralelos secundarios son los círculos menores paralelos al ecuador celeste llamados paralelos de declinación (como en las coordenadas horarias).


La DECLINACIÓN es el arco de máximo de ascensión contado desde el ecuador hacia el astro de 0° a 90° hacia el N o hacia el S. El arco de máximo de ascensión comprendido entre el polo elevado y el centro del astro se llama distancia polar o codeclinación, como en las coordenadas horarias, y, al igual que estas, puede ser menor de 90° o mayor según sean de la misma especie la latitud del observador y la declinación del astro (en el mismo hemisferio a contar desde el ecuador) o de distinta especie (en hemisferios distintos el observador y el astro).

La ASCENSIÓN RECTA es el arco de ecuador celeste comprendido entre el primer máximo de ascensión y el máximo de ascensión correspondiente al astro de que se trate. Se cuenta de 0° a 360° o de 0h a 24h, a partir del primer máximo de ascensión en el sentido del movimiento aparente del sol en la eclíptica (en sentido directo, que es el sentido contrario a las agujas del reloj).



Normalmente se usa el **ÁNGULO SIDÉREO** que es igual a 360 menos la ascensión recta, es decir; es igual al arco de ecuador contado a partir del primer punto de Aries (primer máximo de ascensión) hasta el máximo de ascensión del astro contado de 0° a 360° y en sentido contrario al movimiento aparente del sol en la eclíptica (en sentido retrógrado, o sea; sentido horario visto desde el polo N)

... Este sistema de coordenadas, al contrario de las azimutales (que dependen de la posición del observador) o de las horarias (en las que el horario depende, asimismo, de la posición del observador), son independientes de la posición del mismo y pueden ser publicadas en el almanaque: **DECLINACIÓN** del sol o la estrella respecto del ecuador, y **ÁNGULO SIDÉREO** de la estrella respecto del primer punto de Aries, o punto vernal,



... Este sistema de coordenadas, al contrario de las azimutales (que dependen de la posición del observador) o de las horarias (en las que el horario depende, asimismo, de la posición del observador), son independientes de la posición del mismo y pueden ser publicadas en el almanaque: Del sol nos dice la **DECLINACIÓN** respecto del ECUADOR CELESTE. Y, **de las estrellas**, la **DECLINACIÓN** respecto del ecuador, y **ÁNGULO SIDÉREO** respecto del primer punto de Aries, o punto vernal,

Todo esto ha estado muy bien y ha sido muy bonito, pero... ¿qué tienen que ver estas coordenadas Uranográficas ecuatoriales con el Almanaque Náutico?

...Yo diría que está dormido...

...Err Fritz, ya me explicará para qué demonios necesitaba la llave de mi camarote en el caso de estar yo muerto... Espero que la explicación sea buena... ahora vaya a hacer su guardia al timón.

No puede ser... será que no me ha oído...

Claro que no te ha oído... porque está dormido..., mírale... si hasta se le cae la baba por las barbas...

...Por cierto, no estoy dormido....

Uranó

...Estoy durmiendo... Zzzz...

...A lo peor está muerto...

¡Sssshhh! ¡Rápido, antes de que se enteren los demás... cógele la llave de su camarote....!


...Lo que es la edad...

BOQUERÓN II

Clic

volver a Eclíptica y Zodiaco

Índice



Inaceptable...

¿Qué
medidas
sugiere
Vd.?

¿Está
hablando de
un motín?

¡Ostras, el
capitán!

¡Aaahhh!!

...Yo creo que nuestro
capitán está senil... nos va a
echar a pique si no tomamos
medidas al respecto...

Bueno, ya que
Vd. Lo
menciona.....

...Y después de meternos un
rollo sobre las coordenadas
uranográficas, va y se queda
dormido... pero en cuestión
de segundos...

Pienso que, dadas las
circunstancias, en este
barco hay personas más
competentes para
ejercer el mando...


¡Buh!

...!i
...

Clic

[volver a Eclíptica y Zodiaco](#)

[Índice](#)



...Bu... bueno...
era en sentido
metafórico...

... he dicho "creo";
apreciación
subjettiva carente
de todo rigor
clínico

Bueno... veré... es qe perdí el hilo
de la explicación... entre que
hubo algo que no entendí bien y
algo que no acabé de entender...

...Asi que hay
personas más
competentes que
yo para ejercer el
mando...

Bueno, de hecho hubo algunas
cosas que no entendimos y
que preguntamos... pero Vd.
estaba ensimismado en
profundas reflexiones

con su
iso me
no,
Cap

...Yo... e
no
precipite
no es lo
parec

...Con que estoy senil...

¿Y por qué no
preguntó lo que no
entendía?

...Y mis
explicaciones son
un rollo...

No, no, no... Sí, sí, sí...
No hay motín,,, yo no he pronunciado
para nada esa palabra... me refería a
una baja temporal por enfermedad...
sospecho que Vd padece...
Narcolepsia... y, sí: hubo algunas
cosas que no entendimos... los dos;
mi compañero y yo

¿Entendimos? ¿Pretende
implicar a su compañero
en este intento de
motín?

Bajemos a
discutirlo a
mi
camarote...

...¡Alto, un
momento!... Creo
que ha habido un
malentendido

Clic



Menos mal que has
aparecido... ¡Me
acusa de promover
un motín a bordo!

¡Mentira podrida! Lo
que yo comentaba que
te quedabas dormido
en medio de la
explicación...


Ese es un comentario
tendencioso que no
estoy dispuesto a
permitir!...

...Estabas incitando a
la rebelión al segundo
oficial...

... y...¿Quién es más
competente para ejercer
el mando...? ¿Acaso tú,
con tu "amplia visión" de
las cosas?

...¡Y yo no estoy dispuesto a
permitir que me llamen senil ni
a que se cuestione mi
competencia en el mando de
este barco!...

¡BASTA!



Eso explica muchas cosas... pero tenía que haberlo dicho antes... ¡Hombre!

Halla paz, capitán... Todo ha sido un mal entendido. He hablado con el médico de a bordo y me ha contado lo de su problema de narcolepsia...

Ese matasanos es un bocazas...

¿Cómo se calculan los horarios del sol y de los astros con las coordenadas uranográficas...? Porque lo que nos dice **del sol** el Almanaque Náutico es la **DECLINACIÓN** respecto del ECUADOR CELESTE y el **HORARIO** respecto del meridiano de Greenwich, para todos los días del año... Y no acabo de entender para qué nos sirve eso a la hora de situarnos en la carta.

...Bueno, ¿y qué es lo que he explicado que no habéis entendido?

...Y de las estrellas nos dice el valor del Ángulo Sidéreo y la declinación para cada mes del año... ¿Y con eso qué hacemos?

Bueno, vallamos por partes...



Clic

[volver a Eclíptica y Zodiaco](#)


[Índice](#)


CÁLCULO DE LAS COORDENADAS HORARIAS DEL SOL

Para hallar nuestra situación en relación con el punto astral, o polo de iluminación, del sol (recordemos que es la proyección del sol sobre la tierra), lo primero que hemos de hacer es situar el sol con sus coordenadas horarias respecto del meridiano de Greenwich; declinación y horario. A diferencia del observador que puede estar en cualquier punto del globo, el meridiano de Greenwich está en una situación geográfica conocida. Una vez situado ese punto astral es cuando nosotros, sumando o restando nuestra longitud al horario hallado, calculamos el horario del sol respecto del meridiano de nuestra posición, la declinación del sol es un valor que hallamos con el almanaque, con lo que ya tendremos las coordenadas horarias del sol respecto de nuestra posición. Hecho esto estaremos en condiciones de confeccionar una recta de altura. Pues bien: el Almanaque Náutico nos da para cada día y de hora en hora las declinaciones del sol y el horario respecto de Greenwich. Vamos a ver cómo hace el almanaque tan magna hazaña...

Ya hemos visto que los puntos equinociales no cambian de posición con respecto al globo terráqueo a pesar de la órbita terrestre alrededor del sol; la tierra se mueve alrededor del sol, pero lo hace en un área muy pequeña en relación a la astronómica distancia que le separa del punto vernal, de tal manera que si estuviéramos en dicho lugar, veríamos a la órbita terrestre alrededor del sol como un punto. Por eso, a lo largo del año, el primer punto de Aries no varía, apenas, de posición, siendo por ello una coordenada fija.

(Esta perspectiva no guarda proporción pues el sistema solar sería un punto invisible)






Y hemos visto también que a los efectos de las coordenadas uranográficas consideramos una órbita geocéntrica en la que el sol gira describiendo una órbita inclinada $23^{\circ}27'$ con respecto del ecuador celeste (que es una prolongación del ecuador geográfico). Los puntos en los que se cortan ambos planos son los primeros puntos de Aries y Libra (cuando comienza Aries y Libra, el 21 de Marzo y el 23 de Septiembre respectivamente). En estos puntos la declinación del sol vale 0° .

Vamos a aproximar la imagen de la órbita geocéntrica...


(Esta perspectiva no guarda proporción pues el sistema solar sería un punto invisible)




Imaginemos el sol el día 21 de Marzo; tiene una declinación de 0° sobre el ecuador terrestre y, por extensión, celeste. Vemos que el plano de declinación coincide con el ecuador, es decir; el 21 de Marzo, la declinación del sol vale 0°, o un valor muy próximo a 0°, Como se puede ver en el almanaque de 2003 la declinación varía a lo largo del día entre 00°-01' (+) y 00°-22,7' (+).

Otro día cualquiera el sol, en su recorrido por la eclíptica, ocupará otra posición, con una declinación que ya no valdrá 0°, eso significa que su polo de iluminación no coincidirá con el ecuador, es decir; el paralelo de declinación del sol será un círculo menor que, eso sí, será paralelo al ecuador. En cualquier caso, en el almanaque náutico vienen reflejadas las declinaciones del sol en intervalos de una hora todos los días del año.

El Almanaque Náutico también nos indica el horario del sol en Greenwich, en intervalos de una hora, pero con la ayuda de las tablas de correcciones (incluidas en el almanaque) podemos calcular el horario del sol respecto de Greenwich en cualquier momento del día. Para ello es imprescindible hacer una lectura precisa de la hora en el momento de la observación del astro, sea el sol o una estrella.



Como es un horario mayor de 180° , lo expresaremos en horario oriental:
 $\text{he} \odot G = 060$



Ya tenemos situado el punto astral respecto del meridiano de Greenwich en el momento de la observación; hemos hallado sus coordenadas horarias: la declinación y el horario del sol en Greenwich. Las hemos hallado con las tablas náuticas; la declinación directamente y para el horario hemos entrado con la hora en punto y luego lo hemos corregido por minutos y segundos con la [tabla de correcciones](#). Supongamos el ejemplo de la animación.

Como ese horario astronómico u occidental es mayor de 180° , mediremos el horario oriental...

Pues bien, el meridiano de Greenwich es un lugar geométrico fijo, es decir, siempre está ahí, por eso los horarios del sol en el almanaque están referidos respecto a Greenwich. Pero lo que interesa es hallar el horario del sol respecto de la situación del observador, o mejor expresado: respecto del meridiano de situación del observador.


Como se puede ver, el $h\odot I$ (horario del sol en el lugar) es igual a la longitud del observador menos el $h\odot G$

Para hallar el horario del sol en el lugar ($h\odot I$) la regla es la siguiente: Si nos encontramos al E de Greenwich sumamos nuestra longitud al horario del sol en Greenwich :

$$h\odot I = h\odot G + L$$

Si nos encontramos al W de Greenwich restamos nuestra longitud al horario del sol en Greenwich:

$$h\odot I = h\odot G - L$$



Veamos ahora un ejemplo con un observador situado al W del meridiano 0 (Greenwich). Ya tenemos situado el sol con sus coordenadas horarias...

Situamos al observador en un punto cualquiera al W de Greenwich y medimos su horario...


Como vemos, el horario del sol en el lugar es igual al horario del sol en Greenwich menos la longitud del lugar de la observación. Como es mayor de 180°, lo transformamos a horario oriental (**he⊙I**) restándolo de 360.

En el hipotético caso de haber pasado antes el **hG⊙** a horario oriental (**he⊙G**), lo que haremos es sumar nuestra longitud.

Normalmente no hacemos eso, sino que operamos con horarios astronómicos y, solo al final, cuando ya tenemos el **h⊙I**, lo transformamos en horario oriental si es mayor de 180°. El resultado es el mismo. Veamos un ejemplo:

Tenemos un **hG⊙ = 318° - 30,9'** y una longitud = **018°-25,0'W**

h_wG ⊙ = 318° - 30,9' L = - 018° - 25,0'	h_w⊙ G = 318° - 30,9' Lo restamos de 360°
h_w⊙ I = 300° -05,9' -360°	he⊙ G = 041°- 29,1' Sumamos L +018°-25,0'
he⊙ I = 059° - 54,1'	he⊙ I = 059° - 54,1'



Pues señores... ya tenemos localizado en la superficie del mundo mundial a los puntos astrales del sol, para cualquier momento del día. Tenemos las coordenadas horarias; la declinación y el horario... A partir de aquí ya podremos situarnos en relación a ese punto astral que hemos situado. Lo podremos hacer con una recta de altura del sol... pero ese es otro tema que veremos más adelante...

Vayamos por partes... se llama órbita eclíptica porque en ella, me refiero a la franja de 18° (9° por encima y 9° por debajo del plano de la órbita del sol) es donde acontecen los eclipses.

Y ahora pasamos a explicar cómo situar las coordenadas horarias de las estrellas...

...Y por qué se le llama órbita eclíptica, a la eclíptica del sol...

...Sí: sobre todo teniendo en cuenta que queda por aclarar las coordenadas horarias de las estrellas...



BOQUERÓN II

Clic

Índice

CÁLCULO DE LAS COORDENADAS HORARIAS DE LAS ESTRELLAS

Situamos el meridiano de Greenwich y la DECLINACIÓN y el ÁNGULO SIDÉREO, que encontramos en el Almanaque Náutico

Por definición tenemos que: $h \star G = h \gamma G + A.S.$


Vamos a demostrarlo:

Ejemplo: supongamos que hemos visto en el Almanaque Náutico que el horario de Aries en Greenwich a la hora en que se ha hecho la observación es: $h \gamma G = 90^\circ$

Y que el Ángulo Sidéreo es: $A.S. = 315^\circ$

Si añadimos al A.S. (315°) el valor del $h \gamma G$ (90°) obtendremos un círculo de 405° , es decir; una vuelta (360°) más un arco de 45° , que es el valor del horario del astro en Greenwich

Vamos a ver esto desde el polo Norte...



Volver h en Greenwich

Índice

Volver a coordenadas horarias



Situamos el meridiano de Greenwich, el $h^{\circ}P_G$ y el ÁNGULO SIDÉREO cuyos valores se supone hemos visto en el almanaque ($h^{\circ}P_G = 90^{\circ}$ A.S. = 315°)
Sabemos que: $h^{\star}G = h^{\circ}P_G + A.S.$

Si sumamos los respectivos
arcos...


315°
+ 090°
 $405^{\circ} \rightarrow - 360^{\circ} = 045^{\circ}$

La fórmula para hallar el horario
del sol en Greenwich es:

$h^{\star}G = h^{\circ}P_G + A.S.$

Pues, señoras y señores, ya
tenemos situado al astro en
relación con el ecuador
(declinación) y con el meridiano
de Greenwich ($h^{\star}G$) ...

Ahora sólo falta situarlo respecto
del meridiano del observador



Supongamos que nuestra longitud es 135°, Quiere decir que estamos al W de Greenwich

Anteriormente habíamos hallado el $h_{\star G}$ por la fórmula:
 $h_{\star G} = h_{\star \gamma G} + A.S$, resultando $h_{\star G} = 045^{\circ}$

Pues bien, las fórmulas para hallar el $h_{\star I}$ son las siguientes:
Si nos encontramos al W de Greenwich
 $h_{\star I} = h_{\star G} - L$

Si nos encontramos al E de Greenwich:
 $h_{\star I} = h_{\star G} + L$


Como estamos al W de Greenwich restamos nuestra Longitud

$h_{\star G} = 045^{\circ}$
Longitud = -135°
 $h_{\star I} = -090^{\circ}$

El signo (-) nos dice que el horario es Este (oriental)

Vamos a ver la demostración...

Ahora vamos a ver un ejemplo al estar el observador al ESTE de Greenwich...



Supongamos que $L = 150^\circ \text{ E}$ y que $h \star G = 045^\circ$

Si nos encontramos al E de Greenwich:


$h \star I = h \star G + L$

045°
 $+150^\circ$
 $195^\circ \Rightarrow$ como es (+) es occidental y, por tanto, se mide hacia el Oeste (W)

Decir que nuestra Longitud es 150° ESTE de Greenwich, es lo mismo que decir que nuestra Longitud es 210° al OESTE. Si calculamos el $h \star I$ con una Longitud de 210° W , el resultado es el mismo, sólo que la fórmula que hemos de emplear si nos encontramos al W de Greenwich es:

$h \star I = h \star G - L$

045°
 -210°
 $-165^\circ \Rightarrow$ como es (-) es oriental y, por tanto, se mide hacia el Este (E). Es evidente que $165^\circ \text{ E} = 195^\circ \text{ W}$ pues su suma vale 360°



Pues, caballeros, ya tenemos situado al sol o estrella que nos interesa con sus **coordenadas horarias**, es decir; la declinación, el horario y nuestra latitud que "estimamos" es la correcta después de una singladura. Latitud de estima, coordenadas horarias, junto con las coordenadas azimutales nos permitirán construir un triángulo de posición astronómica...

... El triángulo de posición astronómica es una forma gráfica de explicar cómo están interrelacionados estos dos tipos de coordenadas, de tal manera que conociendo algunos de sus elementos podamos deducir matemáticamente los que faltan, bien sea la altura, el azimut, el horario o la declinación.

El fin último del triángulo de posición astronómica es deducir las fórmulas de trigonometría esférica que nos permiten situar un astro en relación con sus coordenadas horarias o azimutales, es decir: nos permitirán averiguar la altura, declinación, horario o azimut **que tendría el sol o un astro en nuestra situación de estima**. Esto es muy importante porque es el fundamento de la recta de altura, que es la "herramienta" que se utiliza para situarse uno en la Mar cuando no se está a la vista de la costa. La recta de altura la veremos más adelante. Ahora vamos a ver el triángulo de posición astronómica y vamos a deducir las formulas de trigonometría esférica que nos interesan, PERO ESTO EN LA 2ª PARTE.

